



INFLUCID tabl					
Country	BA	FB	FO	ETI	PIL TU
Dimensions	250x148 mm				
Date of creation	22.07.2022				
Last update / Correction	23.01.2023				
Color	schwarz				
Scripture	Pragmatica				
Minimum font size	8 pt				
Conf. Brand Manager	Elena Rudenko	30.01.2023			
First name, Surname, Date					
Conf. Manufacturer					
<i>Gabriele Truz</i>	30.01.2023				
First name, Surname, Date					
Conf. Reg. Affairs					
First name, Surname, Date					

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

INFLUCID

(25 mg + 25 mg) tablet

Aconitum trit. D3, Gelsemium trit. D3, Ipecacuanha trit. D3, Phosphorus trit. D5, Bryonia trit. D2, Eupatorium perfoliatum trit. D1

Prije primjene ovog lijeka pažljivo pročitajte cijelo uputstvo, jer sadrži Vama važne informacije.

Uvijek koristite ovaj lijek kako je opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je to rekao Vaš ljekar ili farmaceut.

- Sačuvajte ovo uputstvo. Možda će biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate potrebu za dodatnim informacijama ili Vam je potreban savjet, обратите se svom farmaceutu.
- Ako ispoljite bilo koje neželjeno dejstvo, обратите se svom ljekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu. Pogledajte dio 4.
- Obratite se sa svom ljekaru ako se ne osjećate bolje ili Vam se stanje pogorša.

Sadržaj ovog uputstva:

1. Šta je INFLUCID i za šta se koristi
2. Šta morate znati prije nego počnete koristiti INFLUCID
3. Kako da koristite INFLUCID
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati INFLUCID
6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

1. Šta je INFLUCID i za šta se koristi

INFLUCID je homeopatski lijek koji se koristi za liječenje prehlade praćene groznicom i bolesti sličnih gripi praćenih povišenom tjelesnom temperaturom.

INFLUCID predstavlja kombinaciju šest dobro dokazanih homeopatskih pojedinačnih lijekova, posebno je pogodna za liječenje prehlade praćenim groznicom i bolesti sličnih gripi, s iznenadnim početkom i brzim napredovanjem. *Aconitum* je djelotvoran u početnoj fazi akutnih infekcija disajnog sistema, posebno u kombinaciji s visokom tjelesnom temperaturom. Pored svoje efikasnosti u liječenju prehlade, *Bryonia* ima poseban utjecaj na suhi bronhitis (upala bronha) s bolnim, nadražujućim kašljem. *Ipecacuanha* omekšava bronhijalni sekret, olakšavajući tako iskašljavanje sluzi. *Gelsemium* je posebno učinkovit kod prehlade, gripe i sinusitisa (upala sinusa) s umorom, bolovima u glavi i tijelu, kao i za upale grla i promuklosti. *Phosphorus* pozitivno djeluje na stanja iscrpljenosti, neuralgije i glavobolje tokom akutnih i hroničnih disajnih infekcija. Uz to, jača imunološki sistem, ubrzavajući tako proces ozdravljenja. Ovu kombinaciju dopunjuje *Eupatorium perfoliatum*, jedan od najčešće korištenih lijekova u homeopatiji za liječenje prehlade i gripe. Zahvaljujući širokom rasponu djelovanja, Influcid brzo i efikasno djeluje na simptome prehlade sa groznicom, poput gripe. Influcid je takođe pogodan za sprečavanje virusnih infekcija.



2. Šta morate znati prije nego počnete koristiti INFLUCID

Nemojte uzimati INFLUCID:

- ako ste alergični na *Eupatorium perfoliatum* ili na drugi član porodice glavočika (Asteraceae) ili na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (navедено u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Posavjetujte se sa ljekarom ako:

- se ne osjećate bolje ili se osjećate lošije;
- se pojave dodatni simptomi;
- povisena tjelesna temperatura traje ili ako se povisi iznas 39°C.

Djeca

Ne smije se koristiti lijek Influcid kod djece mlađe od 1 godine budući da nemam dovoljno podataka o primjeni ovog lijeka u ovoj uzrasnoj grupi.

Korištenje drugih lijekova sa lijekom INFLUCID

Nisu primjećene interakcije sa drugim lijekovima. Kažite svom ljekaru i farmaceutu ako koristite, ako ste do nedavno koristili ili postoj mogućnost da koristite bilo koje druge lijekove.

Uzimanje hrane, pića i alkohola sa lijekom INFLUCID

Loše životne navike, kao i stimulansili alkohol i duhan, mogu negativno uticati na dejstvo homeopatskog lijeka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Konsultujte se sa svojim ljekarom prije korištenja ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i rad na mašinama

INFLUCID nema uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanje mašinama.

INFLUCID sadrži laktuzu (mlječni šećer) i pšenični škrub.

Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom ljekaru prije uzimanja ovog lijeka. Ovaj lijek se smatra sigurnim za osobe s celijakijom. Pacijenti s alergijom na pšenicu (različito od celijakije) ne smiju uzimati ovaj lijek.

3. Kako da koristite INFLUCID

Uvijek koristite ovaj lijek tačno onako kako je to opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš ljekar ili farmaceut. Ako niste sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom. Preporučena doza je:

Odrasli: u akutnim stanjima, 1 tabletu se koristi na svakih sat vremena, do najviše 12 tableta dnevno, dok ne nastupi poboljšanje. U nastavku terapije treba koristiti 1 do 3 tablete dnevno.

Za prevenciju prehlade praćene groznicom i gripi sličnih bolesti, koristite 1 do 2 tablete 3 puta dnevno.



INFLUCID tabl					
Country	BA	FB	FO	ETI	PIL TU
Dimensions	250x148 mm				
Date of creation	22.07.2022				
Last update / Correction	23.01.2023				
Color	schwarz				
Scripture	Pragmatica				
Minimum font size	8 pt				
Conf. Brand Manager					
First name, Surname, Date					
Conf. Manufacturer					
First name, Surname, Date					
Conf. Reg. Affairs					
First name, Surname, Date					

Primjena kod djece

Djeca uzrasta od 1 do 11 godina: kod akutnih stanja treba koristiti po 1 tabletu na svaka 2 sata, do najviše 8 tableta dnevno, dok ne nastupi poboljšanje. U nastavku terapije treba koristiti 1 do 3 tablete dnevno.

Djeca uzrasta 12 godina i stariji: kod akutnih stanja treba koristiti po 1 tabletu na svakih sat vremena, do najviše 12 tableta dnevno, dok ne nastupi poboljšanje. U nastavku terapije ili kod hroničnih stanja treba koristiti po 1 do 3 tablete dnevno.

Za prevenciju prehlade praćene groznicom i gripi sličnih bolesti, djeca uzrasta 1 do 11 godina trebaju koristiti 1 tabletu 3 puta dnevno i djeca uzrasta 12 godina i stariji trebaju koristiti 1 do 2 tablete 3 puta dnevno.

Rastopite lagano tabletu u ustima. Možete rastopiti tabletu u malo vode, za primjenu kod djece. Nemojte uzimati ovaj lijek zajedno sa hranom i pićem. Vodite računa da razmak između uzimanja hrane i lijeka iznosi najmanje pola sata.

Ako ste koristili više lijeka INFLUCID nego što ste trebali

Ne očekuje se štetno djelovanje u slučaju predoziranja.

Ako ste zaboravili koristiti INFLUCID

Ne koristite duplu dozu da biste nadoknadiли preskočenu tabletu.

Ako prestanete koristiti INFLUCID

Ne očekuje se štetno djelovanje.

U slučaju dodatnih pitanja u vezi sa primjenom ovog lijeka obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata koji koriste lijek.

Uvrlo rijetkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosjetljivosti kao što su osip na koži i stomačno-crijevne tegobe.

Napomena: Tokom primjene homeopatskih lijekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno homeopatsko pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lijekom INFLUCID i konsultujte se sa svojim ljekarom.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjnih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumjeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati INFLUCID

Čuvati lijek izvan dohvata i pogleda djece.

Nemojte koristiti lijek poslije isteka roka trajanja navedenog na blisteru i pakovanju. Rok trajanja se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.



Lijk čuvati na temperaturi do 30°C.

Ne bacajte lijek u kanalizaciju ili kućni otpad. Upitajte svog farmaceuta kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoline.

6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

Šta INFLUCID sadrži:

- 1 tabletu (250 mg) sadrži sljedeće aktivne supstance: Aconitum trit. D3 25 mg, Gelsemium trit. D3 25 mg, Ipecacuanha trit. D3 25 mg, Phosphorus trit. D5 25 mg, Bryonia trit. D2 25 mg, Eupatorium perfoliatum trit. D1 25 mg
- Ostali sastojci su: laktoza monohidrat, magnezij stearat, pšenični škrob.

Kako INFLUCID izgleda i sadržaj pakovanja

INFLUCID tablete su bijele ili skoro bijele, ravne tablete sa fasetom, ponekad mogu biti blago prošarane. Blisteri od PVC i aluminijске folije sadrže po 20 tableta u kartonskoj kutiji sa uputstvom za pacijenta. 40 tableta u kutiji.

Režim izdavanja lijeka

Lijk se izdaje bez ljekarskog recepta.

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište)

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG
Steinenfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Njemačka

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG
Steinenfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Njemačka

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka

Alpen Pharma d.o.o.
Husrefa Redžića 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet:

Broj rješenja:
04-07.3-1-2880/21 od 02.12.2022.