

# UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Solidagoren  
7,9 ml/10 ml  
oralna tečnost  
vodeni etanolni ekstrakt herbe zlatice, herbe gusje trave i herbe rastavića

## Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lijek Solidagoren, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom ljekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog ljekara ili farmaceuta.

## U ovom uputstvu pročit ćete:

1. Šta je lijek Solidagoren i čemu je namjenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Solidagoren
3. Kako se upotrebljava lijek Solidagoren
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Solidagoren
6. Dodatne informacije

## 1. ŠTA JE LIJEK SOLIDAGOREN I ČEMU JE NAMJENJEN

Solidagoren se tradicionalno koristi za ispiranje mokraćnih puteva i povećanje protoka urina. Zajedno za obilnim unosom tečnosti (2 litra) može se koristiti u sprečavanju taloženja mokraćnog pijeska u bubrežima i stvaranja mokraćnog kamenca. Solidagoren se može koristiti kao potporna (istovremena) terapija kod blagih simptoma zapaljenja urinarnog trakta. Ovo se temelji samo na tradiciji i dugogodišnjoj upotrebi.

## 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK SOLIDAGOREN

### Lijek Solidagoren ne smijete koristiti:

- ako ste preosetljivi na aktivnu supstancu ili druge sastojke lijeka.
- u slučaju alergije na biljke iz porodice Asteraceae.

### Kada uzimate lijek Solidagoren posebno vodite računa:

- u slučaju nakupljanja vode u tkivima (edem) uzrokovanim oslabljenom srčanom ili bubrežnom funkcijom. Ovo upozorenje je naročito važno kod starijih osoba.

U slučaju pojave krvi u mokraći, povišene tjelesne temperature ili simptoma koji traju duže od 5 dana, potrebno je konsultovati ljekara.

### Djeca:

Ne preporučuje se primjena lijeka Solidagoren kod djece mlađe od 12 godina, usljed nedovoljnih podataka o njegovoj bezbjednosti i efikasnosti u navedenom uzrastu.

### Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Ispitivanja interakcija nisu rađena.

Usljed sadržaja alkohola, moguć je uticaj ovog lijeka na dejstvo drugih lijekova. Do sada nema poznatih interakcija.

### Primjena lijeka Solidagoren u periodu trudnoće i dojenja

Pošto nema dostupnih podataka o sigurnoj primjeni u periodu trudnoće i dojenja, Solidagoren ne treba uzimati u periodu trudnoće i dojenja.

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek posavetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

### Uticaj lijeka Solidagoren na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nema posebnih upozorenja i ne treba očekivati negativan uticaj lijeka Solidagore na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.

### Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Solidagoren

Ovaj lijek sadrži 45 vol. % etanola (alkohola). Ako se uzima po uputstvu za doziranje, unosi se 0,6 g alkohola uzimanjem 30 kapi lijeka. Štetan je za osobe koje boluju od alkoholizma. Mora se obratiti pažnja u liječenju trudnica i dojilja, djece i visoko rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom. Moguće je uticaj na druge lijekove u smislu smanjenja ili povećanja njihovog dejstva.

## 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK SOLIDAGOREN

Lijek Solidagoren uzimajte uvijek tačno onako kako je objašnjeno u ovom uputstvu. Ako niste sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ukoliko Vaš ljekar nije propisao drugačije, uobičajena doza je:

Odrasli i djeca starija od 12 godina: 20 - 30 kapi tri puta na dan. 30 kapi odgovara 1,4 ml.

Solidagoren treba uzimati uz veliku količinu tečnosti.

Napomena: Za vrijeme tretmana, potrebno je unositi velike količine tečnosti u organizam.

### Trajanje tretmana

Dužina upotrebe ovog lijeka praktično nije ograničena. (videti odjeljak 2)

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom ljekaru.

Ako imate utisak da Solidagoren djeluje suviše jako ili suviše slabo, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

## SOLIDAGOREN

Country

BA FB FO ETI PIL TU

Dimensions

170x280mm

Date of creation

20.12.2022

Last update / Correction

21.12.2022

Color

schwarz

Scripture

Myriad Pro

Minimum font size

8 pt

Conf. Brand Manager

First name, Surname, Date

Conf. Manufacturer

First name, Surname, Date

Conf. Reg. Affairs

First name, Surname, Date

### Ako ste uzeli više lijeka Solidagoren nego što je trebalo

Ako ste slučajno odjednom uzeli dvostruko ili trostruko veću dozu lijeka od preporučene (tj. 40-90 kapi), u pravilu, ne javljaju se neželjene posljedice. U tom slučaju, nastavite sa uzimanjem lijeka prema uputstvu za doziranje. U slučaju značajnog predoziranja lijeka, može doći do pojačanja neželjenih dejstava (videti odjeljak 4 Moguća neželjena dejstva). U tom slučaju, molimo Vas, konsultujte ljekara ili farmaceuta.

### Ako ste zaboravili da uzmete lijek Solidagoren







Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu. Jednostavno, nastavite da uzimate Solidagoren kao što Vam je to propisao ljekar ili kako je navedeno u ovom uputstvu.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

## 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek Solidagoren, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

	Veoma često:	( $\geq 1/10$ )
	Često:	( $\geq 1/100 - < 1/10$ )
	Povremeno:	( $\geq 1/1000 - < 1/100$ )
	Rijetko:	( $\geq 1/10\ 000 - < 1/1000$ )
	Veoma rijetko:	(< 1/10 000)
	Nije poznato:	(ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka)

Registracija neželjenih dejstava uključuje sva neželjena dejstva koja su se pojavila u toku tretmana zlaticom, gusjom travom ili rastavićem, uključujući i slučajeve upotrebe većih doza ili dužeg trajanja tretmana.

Veoma rijetko: reakcije preosjetljivosti ili alergijske reakcije. Nije poznato: blagi gastrointestinalni simptomi. U slučaju prvih znakova reakcije preosjetljivosti (npr. osip na koži), treba prekinuti terapiju ovim lijekom.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog ljekara ili farmaceuta.

### Prijavlivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumjeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

## 5. KAKO ČUVATI LIJEK SOLIDAGOREN

Čuvati van domašaja djece.

### Rok upotrebe

3 godine.

Nemojte koristiti lijek Solidagoren poslije isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i bočici. Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Rok upotreba nakon otvaranja: 3 mjeseca.

### Čuvanje

Lijek čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju. Neiskorišćeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

## 6. DODATNE INFORMACIJE

### Šta sadrži lijek Solidagoren

Aktivna supstanca: 10 ml (= 9,5 g) oralne tečnosti sadrži 7,9 ml etanolnog ekstrakta (1:1,5-2,1) *Solidago gigantea L., herba* (herba zlatice), *Potentilla anserine L., herba* (herba gusje trave) i *Equisetum arvense L., herba* (herba rastavića) u odnosu 4,2:1,4:1. Rastvarač za ekstrakciju: etanol 50% (v/v).

Ostali sastojci su: prečišćena voda; etanol 96% (v/v).

### Kako izgleda lijek Solidagoren i sadržaj pakovanja

Bistra tečnost braon boje. Veličine pakovanja: bočica 20 ml

### Proizvođač:

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG, Steinfeld 3  
77736 Zell am Harmersbach,  
Njemačka

### Proizvođač gotovog lijeka:

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG, Steinfeld 3  
77736 Zell am Harmersbach,  
Njemačka

### Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet u BiH:

Alpen Pharma d.o.o., Husrefa Redžića 9, 71 000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

### Režim izdavanja

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

### Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:

Solidagoren 7,9 ml/10ml, oralna tečnost, 20 ml: 04-07.3-2-7366/20 od 15.12.2021.

## SOLIDAGOREN

Country

BA FB FO ETI PIL TU

Dimensions

170x280mm

Date of creation

20.12.2022

Last update / Correction

21.12.2022

Color

 schwarz

Scripture

Myriad Pro

Minimum font size

8 pt

Conf. Brand Manager

First name, Surname, Date

Conf. Manufacturer

First name, Surname, Date

Conf. Reg. Affairs

First name, Surname, Date

